



VACUNA ROTAVIRUS

El **rotavirus** es un virus que produce gastroenteritis:

- ▶ Supone entre el 15-30% de todas las gastroenteritis agudas.
- ▶ Principal causa de ingreso hospitalario por diarrea en la etapa infantil.
- ▶ Los menores de 2 años son los que tienen más riesgo de sufrir complicaciones.
- ▶ A los 2 años prácticamente todos los niños han sufrido una gastroenteritis por rotavirus.

ADMINISTRACION

Via oral. Puede administrarse conjuntamente con le resto de vacunas.

DOSIS

- ▶ Primera dosis entre 6 y 12 semanas de vida.
- ▶ Intervalo mínimo entre dosis 1 mes.
- ▶ Recomendamos administrar conjuntamente con vacunas del calendario vacunal.

NUESTRA RECOMENDACIÓN

Vacuna	Edad	Dosis
Rotarix	2 meses	1ª dosis
	4 meses	2ª dosis
Rotateq	2 meses	1ª dosis
	4 meses	2ª dosis
	6 meses	3ª dosis

NOMBRES COMERCIALES

Rotarix: 2 dosis
Rotateq: 3 dosis

FECHA LÍMITE ÚLTIMA DOSIS

Rotarix: 24 semanas
Rotateq: 32 semanas

CONTRAINDICACIONES

Invaginación intestinal previa
Malformaciones digestivas que predisponen a una invaginación intestinal

REACCIONES ADVERSAS

Poco frecuentes, si aparecen son diarrea, vómitos y fiebre moderada