

NORMAS DE RECOGIDA DE ORINA EN BEBÉS

► Instrucciones para el paciente

- El recipiente debe ser un recolector adhesivo pediátrico (ADESAK pediátrico o similar) estéril, por lo que debe estar dentro de una bolsa CERRADA.

► Preparación del paciente:

- DIETAS: no hay ningún tipo de prohibición o precaución sobre los alimentos tomados por el bebé.
- MEDICAMENTOS: no es necesario eliminar ningún medicamento que tome habitual o esporádicamente, aunque sería conveniente informar al laboratorio.

► Procedimiento para la toma de muestra:

- La higiene previa en los niños es similar a la realizada en los adultos.
- Primero es necesario realizar una limpieza previa de los genitales utilizando agua y jabón, siguiendo la dirección de arriba a abajo.
- En el caso de niños, debe retirar el prepucio para realizar dicha limpieza y en el caso de niñas debe separar los labios vaginales mayores y menores para realizar la misma operación.
- En ambos casos, la limpieza de los genitales también se puede realizar con las toallitas higiénicas comerciales diseñadas para este uso.
- Por favor, revise si ha cumplido adecuadamente las instrucciones 1, 2 y 3 antes de pasar a la toma de la muestra.
- Colocar el recolector adhesivo pediátrico de forma que quede firmemente sujeto a la zona circundante de los genitales.
- Esperar un máximo de 30 minutos a que realice la micción, observando cada 10 minutos.
- Si pasado este tiempo no se ha producido la esperada micción, retire cuidadosamente el recolector, volver a realizar la limpieza y repetir desde el anterior hasta conseguir un volumen suficiente de orina.
- Una vez recogida la orina cortar la bolsa pediátrica con una tijera y trasvasarla a un tarro universal estéril.

Importante:

- Si espera entregar la muestra de orina pasadas más de 2 horas desde la toma, mantenga la muestra refrigerada a 4°C.
- Entregar la muestra en la Sala de Extracciones del Hospital Imed con la petición del médico solicitante, en día laborable de lunes a viernes.